

PREVENTION DU VIH PARMI LES POPULATIONS CLES

BULABULA A.M, MD, PhD

La prévention primaire

a été un élément essentiel de la riposte
dans

- passé,
- le reste dans le présent, et
- le sera encore longtemps dans l'avenir

Les populations clés

notamment

- les professionnel(le)s du sexe,
- les personnes qui s'injectent des drogues,
- les personnes transgenres

Les populations clés

- les prisonniers,
- les hommes homosexuels et
- autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Les populations clés

- restent beaucoup plus *exposées à l'infection au VIH*
- sont entre *10 et 24 fois plus susceptibles de contracter le VIH* que les adultes dans la population générale (UNAIDS, 2016).

Depuis 2010,

- le nombre de nouvelles infections à VIH chez les adultes est resté stable dans le monde,
- à un niveau estimé de 1,9 million,

Les nouvelles infections à VIH

- augmentent à l'échelle mondiale
 - chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Les nouvelles infections à VIH

aucune réduction apparente

- chez les professionnel(le)s du sexe,
- les personnes transsexuelles,
- les consommateurs de drogues et
- les détenus.

La prévalence du VIH

En Afrique australe

- 10 à 20 fois plus élevée chez les *professionnel(le)s du sexe* que chez les adultes
- avec des taux d'infection à VIH atteignant 50 % de tous les professionnel(le)s du sexe testés et une prévalence du VIH atteignant 86 % dans une étude menée au Zimbabwe.

La prévalence du VIH

- 86 % dans une étude menée au Zimbabwe
- Chez plus de 11 000 *personnes transsexuelles* à l'échelle mondiale estime la prévalence du VIH à 19,1 % au sein de cette population.

Les populations clés

- demeurent parmi *les plus vulnérables au VIH*
- 90 % des nouvelles infections à VIH en 2014
- 45 % des nouvelles infections à VIH dans le monde en 2015.

La prévention du VIH au sein des populations clés

- nécessite des investissements nationaux et internationaux afin de fournir aux populations clés des outils,

La prévention du VIH au sein des populations clés

Les outils comme

- *des préservatifs et des lubrifiants,*
- *une prophylaxie pré-exposition et*
- *des aiguilles et seringues stériles, ainsi que des tests de dépistage et un traitement.*

LA PREVENTION PRIMAIRE DU VIH PARMIL LES PERSONNES VULNERABLES

La femme et la fille

La vulnérabilité de cette catégorie est:

- Biologique
- Culturelle
- Economique

La vulnérabilité

Biologique

- Elle liée à la physiologie normale de la personne du sexe féminin et à son anatomie
- La surface exposée aux virus au niveau de l'organe génital de la femme est plus large que chez l'homme

La vulnérabilité

Biologique

- La fragilité de la muqueuse vaginale (couche tapissant l'intérieur du vagin) est caractéristique chez la jeune fille et chez la ménopausée
- Pendant les règles, la grossesse et après l'accouchement

La vulnérabilité

Culturelle

- L'épouse doit se soumettre
- Elle n'a pas le droit d'imposer le préservatif au mari dans certaines circonstances
- Elle n'est pas beaucoup instruite

La vulnérabilité

Economique

- La mère n'est pas économiquement forte
- Dans le contexte congolais les dames supportent le poids de leur famille

Toutes les circonstances citées ci-haut exposent beaucoup la femme aux infections sexuellement transmissibles et au VIH

La prévention

- Comprendra tous les moyens à rendre la femme autonome, instruite, sécurisée, et lui permettre l'accès aux soins pour détecter et soigner les maladies sexuellement transmissibles.

MERCI